

GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN EL VIVERO



Scan for Video!

EL MOMENTO MÁS DIFÍCIL PARA LOS EQUIPOS DE CERDOS Y ESTABLOS EN UN AMBIENTE DE CRIANZA ES LA INICIATIVA DE LOS CERDOS DESPUÉS DEL DETETE

Los primeros 14 días post destete son críticos en esta etapa de producción. El manejo eficaz de la alimentación y el respaldo ayudará a los productores y sus equipos a garantizar un comienzo exitoso y, en última instancia, un gran cerdo de mercado. Estas recomendaciones se basan en una edad de destete de 21 días y un estado de salud promedio. Es posible que sea necesario ajustar la gestión si la producción de su granja es significativamente diferente. Se puede obtener ayuda consultando a su representante del servicio técnico de DNA Genéticos.

ESTE ENSAYO DE CASI 6,000 CERDOS MIDIÓ EL IMPACTO DE LA ALIMENTACIÓN CREEP EN LA CERDA DURANTE LOS ÚLTIMOS 7 DÍAS DE LACTANCIA.

Si bien no es estadísticamente diferente, los resultados muestran una tendencia positiva en todas las áreas medidas frente al grupo de control; especialmente aumentó el consumo de alimento, lo que redujo la mortalidad en un 0.71%.

	SIN CREEP FEED	CON CREEP FEED
PESO AL NACER (LBS.)	2.78	2.89
PESO AL DESTETE (LBS.)	13.29	14.35
1 SEMANA DESPUÉS DE LA ENTRADA A NURSERÍA (LBS.)	14.59	15.52
6 SEMANAS DESPUÉS DE LA ENTRADA A NURSERÍA (LBS.)	45.86	48.94
18 SEMANAS DESPUÉS DE LA ENTRADA A NURSERÍA (LBS.)	229.28	231.49
MORTALIDAD EN NURSERÍA (%)	6.11	7.48
MORTALIDAD EN ENGORDA (%)	4.34	3.86


ALIMENTACIÓN DE COLCHONETA

Un paso crítico para que los lechones destetados comiencen correctamente es colocar el alimento en esteras para que los cerdos puedan encontrar el alimento seco y sea más fácil de consumir. La recomendación es alimentar 3 oz. de alimentación seca sobre la estera por 10 cerdos. Muchos productores tienen éxito alimentando en esteras hasta cuatro veces al día, especialmente cuando los viveros están sobrecargados. Se puede usar o aproximar una taza de medir usando las manos. Dos puñados son aproximadamente 12-16 oz. de pienso. La alimentación en el tapete permite a los cerdos establecer su comportamiento de búsqueda y lamer el alimento de sus narices. También se puede usar alimento granulado o desmoronado cuando se alimenta en esteras



RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ALIMENTACIÓN DE TAPETES

Los resultados no mostraron diferencia estadística para ADG o ADFI; sin embargo, existe una clara ventaja de mortalidad al asegurarse de que los equipos utilicen la alimentación con tapete en todos los cerdos para ayudarlos a alimentarse de inmediato y no quedarse atrás. Este estudio incluyó 24,000 cerdos de destete con el grupo de control solo alimentados con esteras para enfermos/recuperación y corrales pequeños.



GESTIÓN DE LA ALIMENTACIÓN EN EL VIVERO



Scan for Video!

MUERTE DE HAMBRE

Los productores deben presupuestar entre un 10% y un 15% del flujo posterior al destete, ya que los cerdos mueren de hambre para poder llevarlos a otro corral para recibir cuidados adicionales. Incluso si se siguen los protocolos de alimentación con gachas y esteras, es posible que muchos cerdos no coman bien y los que no comen deben ser llevados a un corral para enfermos. Las salidas de hambre se pueden detectar visualmente. Cuando identifique visualmente cerdos que se mueren de hambre o que retroceden, busque cerdos que estén demacrados con la cabeza hacia abajo.



ALIMENTACIÓN DE PALOMAS

La mayoría de los cerdos encuentran alimento dentro de las 12 horas posteriores al destete. Hay una pequeña población que puede pasar más de 24 horas sin encontrar alimento y debe identificarse y llevarse a los corrales pequeños y de enfermos. Cuando estos cerdos son llevados a corrales pequeños o enfermos, las gachas deben ser una parte clave de su dieta para garantizar que tengan el mejor comienzo. Las gachas deben mezclarse primero hasta obtener una consistencia acuosa de "sopa" (3 partes de agua/1 parte de alimento seco) para que, a medida que los cerdos beban, también ingieran los nutrientes del alimento. La primera dieta infantil normalmente tiene productos lácteos y subproductos animales, por lo que las gachas deben consumirse dentro de los 30 a 45 minutos para evitar que se echen a perder. Para mantener a los cerdos secos y tibios, los recipientes extenuantes deben mantenerse alejados de las áreas para dormir y los recipientes deben limpiarse en los pasillos. La recomendación sería utilizar los comederos rojos con la cubierta rallada. Esto evita que los cerdos caminen a través de las gachas, lo que también ayuda a mantenerlos secos.

COBERTURA DEL BANDEJA DE ALIMENTACIÓN

La dieta inicial debe estar en el comedero antes de que lleguen los cerdos con la configuración adecuada del comedero. Debido a que la primera dieta contiene una gran cantidad de productos lácteos, el alimento puede volverse pegajoso por las narices de los cerdos o por la humedad en la habitación. Para esta dieta, la cobertura del plato de alimentación debe ser del 85 al 100% para ayudar a que el alimento fluya libremente y evitar que se escape. Con el tiempo, la cobertura se puede reducir al 50% durante el período de destete para evitar el desperdicio de alimento y maximizar el rendimiento.

