

POR QUÉ ES IMPORTANTE LA CONDICIÓN CORPORAL DE LA CERDA?



PRODUCCIÓN MEJORADA A PARTIR DE UNA CONDICIÓN CORPORAL MÁS DELGADA

La condición de la cerda a menudo se percibe como una preferencia del administrador de la granja de cerdas. Algunos prefieren cerdas magras mientras que otros prefieren una cerda más grande. Realmente importa? Si el objetivo es aumentar el consumo de alimento durante la lactancia, entonces la respuesta es sí. Las ganancias de productividad a menudo se pueden lograr establecer un estándar más delgado para la condición corporal cuando las primerizas o las cerdas comienzan a parir. La recomendación de profundidad de grasa dorsal para la línea 241 es de 11-15 mm cuando esta lista para parir. En esta condición, los administradores de la granja pueden aumentar el consumo de alimento durante la lactancia, pero también ahorrar en el presupuesto de alimentación durante la fase de gestación y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de mantenimiento de la cerda y los cerdos en desarrollo.

EXISTE UNA CORRELACIÓN POSITIVA ENTRE UNA CERDA MÁS DELGADA AL MOMENTO DEL PARTO Y UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD

Las cerdas alimentadas para cumplir, pero no exceder, sus requerimientos de energía de mantenimiento (3.5-4lb/día) durante la etapa de mantenimiento de la gestación tendrán un ADFI más alto durante la lactancia y pueden producir los siguientes beneficios para un sistema comercial:

AHORRO DE ALIMENTACION

Una estimación del ahorro de alimentación durante la gestación equivaldrá a un total de 115 libras por turno. Un LSY de 2.4 equivaldría a \$27.60/cerda/año. El aumento de la ingesta de alimento en lactancia de lb/día durante 21 días agregaría \$7.50/cerda al costo del alimento para un ahorro neto de **\$20.10/cerda/año**

PESOS AL DESTETE AUMENTADOS

0.5 Libras adicionales de peso destete/cerdo a \$0.5/lb = **\$7.50/cerda/año** a 30 PSY

MEJORA DEL TAMAÑO DE LA CAMADA POSTERIOR


Extra 0.25 cerdos/camada = 0.6 cerdos BA/año x PWM = 0.5 extra PSY = **\$15/cerda/año**

MENOS DIAS AL ESTRO POST-DETETE

Promedio 1 día antes, 1 día no productivo es \$2, entonces 2.4 litros por año = **\$4.80/cerda/año**

RECOMENDACIONES DE CAÍDA DE ALIMENTACIÓN DIARIA

Las cantidades de alimentación deben estar coordinadas con la puntuación de la condición corporal



*Please discuss with your nutritionist/veterinarian before implementing recommendations

COMO CALIFICAR VISUALMENTE LA CONDICION CORPORAL

- Al puntuar BCS es importante pararse detrás de la hembra. Debe tener forma de reloj de arena desde los hombros hasta la sección media/costillas hasta las caderas.
- Al ver su línea superior desde atrás, debe disminuir suavemente desde su columna vertebral. Debe ser necesaria una ligera presión para palpar la columna vertebral y los huesos de la cadera.
- Una columna que sobresale y que no requiere presión para sentirla es demasiado delgada, un estante ancho y plano de un trompo donde es difícil sentir la columna o los huesos de la cadera indica que pesa demasiado.

DNA GENETICS - BEST PEOPLE, BEST PIG, BEST GENETIC OPTION